$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=0.522^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+$














^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=-2.77^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.43, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$














$^2H,Q^2=0.75GeV^2,\varepsilon=0.43,\Theta_{pq}=4^o,\pi^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.7, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.7, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$














^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.33, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.33, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=1GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$














^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.27, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$