$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=0.522^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=0.522^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=0.522^o, \pi^+, simc$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=0.522^o, \pi^+, simc$














^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=0.522°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=0.522°,π$^+$
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=2°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ_{pq}=2^o,π^+













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+, simc$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+, simc$














^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=2°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=2°,π$^+$
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+, simc$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.37, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+, simc$














^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.37,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=-2.77°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ_{pq}=-2.77^o,π^+













^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ_{pq}=-2.77^o,π^+,simc













^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ_{pq}=-2.77^o,π^+,simc














^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=-2.77°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=-2.77°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+, simc$













^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ_{pq}=0^o,π^+,simc














^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=2°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+$













$^2H,Q^2=0.6GeV^2,\varepsilon=0.74,\Theta_{pq}=2^o,\pi^+,simc$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=2^o, \pi^+, simc$














^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=2°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=2°,π$^+$
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar
SIMC/EXP
ID
1


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
experimental
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar

$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+, simc$













$^2H, Q^2=0.6 GeV^2, \varepsilon=0.74, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+, simc$














^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.6GeV^2,ε=0.74,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.43,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.43, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.43, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+, simc$













$^2H,Q^2=0.75GeV^2,\varepsilon=0.43,\Theta_{pq}=0^o,\pi^+,simc$














^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.43,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq
SIMC/EXP


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.43,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.43,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.43, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.43, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+, simc$













$^2H,Q^2=0.75GeV^2,\varepsilon=0.43,\Theta_{pq}=4^o,\pi^+,simc$














^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.43,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.43,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=-4°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ_{pq}=-4^o,π^+













^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=-4^o,π$^+$,simc













^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ_{pq}=-4°,π^+,simc














^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=-4°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=-4°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
experimental
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$,simc
ID 1001
simulation
missmass
ID 1002
simulation
W
ID 1003
simulation
Q2
ID 1004
simulation
t
ID 1005
simulation
theta_pq
ID 1006
simulation
phi_pq

^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ_{pq}=0^o,π^+,simc














^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=0^o,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


$^2H,Q^2=0.75GeV^2,\varepsilon=0.7,\Theta_{pq}=4^o,\pi^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=0.75 GeV^2, \varepsilon=0.7, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$













^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ_{pq}=4^o,π^+,simc













$^2H,Q^2=0.75GeV^2,\varepsilon=0.7,\Theta_{pq}=4^o,\pi^+,simc$














^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=0.75GeV^2,ε=0.7,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ$_{pq}$=0^o,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.33, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$













^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ_{pq}=0^o,π^+,simc













^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$,simc














^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ$_{pq}$=0^o,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ$_{pq}$=0^o,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ_{pq}=4^o,π^+













^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ_{pq}=4^o,π^+,simc













^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$,simc














^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.33,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=-4°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=1GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=1GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+, simc$













^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ_{pq}=-4^o,π^+,simc














^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=-4°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=-4°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=0^o,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=1 GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$













^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ_{pq}=0^o,π^+,simc













^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$,simc














^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=0^o,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=0^o,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=1GeV^2, \varepsilon=0.65, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$














^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$,simc
ID 1001
simulation
missmass
ID 1002
simulation
W
ID 1003
simulation
Q2
ID 1004
simulation
t
ID 1005
simulation
theta_pq
ID 1006
simulation
phi_pq

^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$,simc














^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1GeV^2,ε=0.65,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
experimental
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$,simc
ID 1001
simulation
missmass
ID 1002
simulation
W
ID 1003
simulation
Q2
ID 1004
simulation
t
ID 1005
simulation
theta_pq
ID 1006
simulation
phi_pq

^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ_{pq}=0^o,π^+,simc














^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$













^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ_{pq}=4^o,π^+,simc













^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ_{pq}=4^o,π^+,simc














^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.27,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ$_{pq}$=-4°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ_{pq}=-4^o,π^+













$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=-4^o, \pi^+, simc$













^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ$_{pq}$=-4^o,π$^+$,simc














^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ$_{pq}$=-4°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ$_{pq}$=-4°,π$^+$
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar
ID
1


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
experimental
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq

$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+$













$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+, simc$













$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=0^o, \pi^+, simc$














^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ$_{pq}$=0°,π$^+$
ID
1
SIMC/EXP
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar

^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ_{pq}=4^o,π^+













$^2H, Q^2=1.6 GeV^2, \varepsilon=0.63, \Theta_{pq}=4^o, \pi^+$













^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ_{pq}=4^o,π^+,simc













^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ_{pq}=4^o,π^+,simc














^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ$_{pq}$=4^o,π$^+$
ID 1
SIMC/EXP
missmass
W
Q2
t
th_pq
phi_pq


^{2}H,Q^2=1.6GeV^2,ε=0.63,Θ$_{pq}$=4°,π$^+$
SIMC/EXP
ID
1
hsdelta
hsyptar
hsxptar
ssdelta
ssyptar
ssxptar